

CLEAN & COMPANY

PROTOCOLO DE MANIPULACIÓN Y DILUCIÓN VIROL-OXY

Presentación Tarro 1 kilogramo y balde de 6 kilogramos

- El producto en polvo para el llenado de recipientes (bidones, baldes, botellas, etc.) debe realizarse con tapabocas N95, gafas protectoras, guantes de hule.
- Las proporciones de dilución son al 1% (10gr por litro) y/o al 0,5% (5gr por litro).
- Las diluciones deben ser realizadas en recipientes vírgenes (limpios), sin restos ni residuos de productos de ningún tipo. Para esto debe realizarse una verificación visual y olfativa de los recipientes en los que se realizaran las diluciones en sus diferentes proporciones.
- El producto recién preparado adquiere un tono en la gama del color magenta que con el correr de las horas irá transparentando.
- Una vez diluido, Virol-Oxy tiene un vencimiento de 10 días, por esta razón, los recipientes en los que se produce la mezcla deben ser rotulados con la fecha de vencimiento. Ej: Se prepara un bidón de 10L (al 1% o 0,5%) el 1/12/20, en dicho bidón se deberá registrar de forma inmediata en etiqueta adhesiva o marcador permanente la fecha de expiración del producto en este caso 10/12/20.
- En caso de que la etiqueta, marcador u otro método se borre, pierda o deteriore y no pueda definirse la fecha de vencimiento, se verificara de forma olfativa. El producto en óptimas condiciones tiene un leve olor hipocloroso. El producto vencido tiene un olor fuerte, invasivo y en extremo irritante, por lo que al momento de la verificación olfativa la inhalación debe ser lenta y a distancia.
- Virol-Oxy debe contar con recipientes exclusivos para su dilución y uso. Los mismos deben ser rotulados de forma visible con el nombre completo del producto: VIROL-OXY.
- Virol-Oxy en polvo o diluido en cualquiera de sus proporciones no debe mezclarse con ningún otro producto.
- El producto no es apto para consumo humano en ninguno de sus estados.
- El producto en polvo debe mantenerse en su recipiente de origen, perfectamente cerrado, y guardarse en lugar seco a temperatura entre 0° y 30°.
- Bajo ningún motivo o circunstancia se retirará el contenido en polvo de la bolsa contenedora que viene dentro del balde de 6 kilogramos. El producto debe permanecer en la bolsa contenedora original.
- Mantener el producto en polvo alejado del fuego.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación botella 1L

CLEAN & COMPANY

- La botella debe venir con tapa precintada y contiene Virol-Oxy al 1% en polvo.
- Una vez abierto el envase, el mismo debe colmarse (llenarse) únicamente con agua quedando listo para aplicar.
- Una vez diluido, Virol-Oxy tiene un vencimiento de 10 días, por esta razón, al momento de llenar la botella con agua, la misma debe ser rotulada de inmediato con la fecha de vencimiento. Ej: Si la botella se llena el 1/12/20, a la misma se le deberá registrar en etiqueta adhesiva o marcador permanente la fecha de expiración del producto, en este caso 10/12/20.
- En caso de que la etiqueta, marcador u otro método se borre, pierda o deteriore y no pueda definirse la fecha de vencimiento, se verificara de forma olfativa. El producto en óptimas condiciones tiene un leve olor hipocloroso. El producto vencido tiene un olor fuerte, invasivo y en extremo irritante, por lo que al momento de la verificación olfativa la inhalación debe ser lenta y a distancia.
- Bajo ningún motivo o circunstancia se retirará el contenido en polvo de la botella. Una vez abierto el envase, el llenado de este deberá ser de forma inmediata.
- Una vez terminado el contenido del producto en la botella, la misma podrá ser recargada y reutilizada únicamente con Virol-Oxy en polvo o líquido al 1%. Bajo ningún concepto, motivo o circunstancia recargar la botella con otro producto líquido, en polvo o en otro estado.
- Virol-Oxy en polvo o diluido en cualquiera de sus proporciones no debe mezclarse con ningún otro producto.
- El producto no es apto para consumo humano en ninguno de sus estados.
- El producto en polvo debe mantenerse en su recipiente de origen, perfectamente cerrado, y guardarse en lugar seco a temperatura entre 0° y 30°.
- Mantener el producto en polvo alejado del fuego.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Método de aplicación

- Mopa/trapo de pisos – Se vierte o elabora en balde el producto líquido al 1% o al 0,5%, se embebe la mopa o trapo y se aplica de modo tradicional en pisos de cualquier tipo.
- Aspersores nebulizadores domésticos. Verificar que las boquillas de nebulización estén en modo de nebulización fina (no chorro). Este método deberá utilizarse en oficinas, muebles, alfombras, teclados de computadora, terminales telefónicas, llaves de luz, picaportes, y zonas de contacto continuo. La aspersión de estos ambientes deberá realizarse en abundancia hacia el techo, de manera que la nebulización decante y cubra al máximo las superficies a desinfectar.

CLEAN & COMPANY

- En caso de concentración de producto pueden aparecer “lamparones” de polvillo fino blanco. Los mismos se eliminan pasando paño húmedo sobre estos eventuales lamparones. Estas situaciones pueden darse en caso de aplicar el producto de forma directa sobre las superficies, por esa razón recomendamos la aspersion hacia el techo y si se va a realizar de forma directa deberá efectuarse a una distancia superior a los 30cm.
- En vehículos rociar habitáculos, butacas, maleteros, cabinas y todas las zonas de contacto con aspersor en modo nebulizador, esperar que decante y seque. Repasar luego con franela seca.

Periodicidad de la aplicación

- **Baños / Vestuario / Comedores**– En pisos al 0,5 % una vez al día.
- **Baños / Vestuarios/ Comedores**- Al 1% en Resumideros, tazas sanitarias, orinales, piletas, puertas, grifos, cisternas, lockers y superficies elevadas, una vez al día.
- **Oficinas, salas de reuniones, áreas de recreación y/o descanso** – Una vez por semana al 1% en pisos, mobiliarios, teclados, terminales telefónicas, handies, moquetas, etc.
- **Vehículos (buses, autos, camiones, camionetas, minibuses, vagones)** – Una vez cada 10 días al 1%.

Mantenimiento

- La característica auto limpiante de Virol-Oxy requieren que entre aplicación y aplicación se utilice únicamente agua y/o agua y detergente neutro.
- El uso de hipoclorito de sodio y/o limpiadores ácidos o alcalinos, devastan las propiedades residuales y asépticas de Virol-Oxy.

Advertencias producto en polvo:

- En caso de ingestión NO PROVOCAR VOMITO
- Contacto con los ojos, lavado a chorro abundante durante 15 minutos.
- Contacto con la piel, lavado de partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente y llevarla a área ventilada.
- Consultar al CIAT tel: 1722. Hospital de Clínicas piso 7.

Por más información sobre Virol-Oxy www.virol-oxy.com